

Az oltási rend amit leggyakrabban használók

2019.12.31-től	Hónap	Kötelező oltások			Ajánlott oltások		
	2	Pentaxim	Prevenar13			Rota	
	2,5					MenC 1*	
	3	Pentaxim				MenC 1**	MenB 1.
	4	Pentaxim	Prevenar13			Rota	
	5					MenC 2.	MenB 2.
	12		Prevenar13			MenC 3. vagy Nimenrix	
	13				Bárnyhimlő		
	15			MMR			MenB 3.
18	Pentaxim			Bárnyhimlő			

* ha MenB oltást is kérnek

** ha MenB oltást NEM kérnek

*** ha bárnyhimlő ellenes oltást kérnek

****ha bárnyhimlő oltást nem kérnek.

Pentaxim	diftéria, gyermekbénulás, tetanusz, Haemophilus infl., szamárköhögés
Prevenar 13	Pneumococcus
MMR (Priorix)	rózsahimlő, mumpsz, kanyaró
Rota	Rotavírus
Bárnyhimlő	u.a.
MenC	Meningococcus C típus
MenB	Meningococcus B típus
Nimenrix	Meningococcus A, C, W, Y típus
Tetraxim	diftéria, gyermekbénulás, tetanusz, szamárköhögés
Prevenar 13	Pneumococcus
MMR (Priorix)	rózsahimlő, mumpsz, kanyaró
Rota	Rotavírus
Bárnyhimlő	u.a.
MenC	Meningococcus C típus
MenB	Meningococcus B típus
Nimenrix	Meningococcus A, C, W, Y típus
Tetraxim	diftéria, gyermekbénulás, tetanusz, szamárköhögés
Boostrix	diftéria, tetanusz, szamárköhögés
EngerixB	Hepatitis B